



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA
SLOBOZIA, STR. COSMINULUI NR. 4, COD 920013 IALOMIȚA
Tel. 0243-230280 Fax. 0243-232384; E-mail: dsp.ialomita@dspialomita.ro

Nr. IL 53/15 data 07.06.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Masuri pentru prevenirea imbolnavirilor prin vectori: capuse, tantari

Vectorii sunt entități mici (țânțarii, muștele, gândacii, căpușele, melcii de apă dulce) care pot transmite boli de la o persoană la alta și dintr-un loc în altul.

Aceștia ne pot pune sănătatea în pericol atât acasă, cât și atunci când călătorim.

Bolile transmise prin vectori sunt afecțiuni cauzate de acești agenți patogeni în populațiile umane.

Controlul vectorilor rămâne principala măsură de reducere a numarului de imbolnaviri la nivel comunitar.

In cazul tantarilor:

Se impune controlul populației de țânțari prin dezinsecție periodică, lucrări agrotehnice de salubrizare și igienizare.

Prevenția individuală se bazează pe utilizarea de plase impregnate cu insecticide la ferestre/împrejurul patului, folosirea de insecticide indoor sub formă de aerosoli, benzi impregnate sau pastile. Se recomandă purtarea de haine cu mânci lungi, pantaloni lungi și șosete, mai ales seara, și utilizarea repelenților.

Pentru prevenirea imbolnavirilor prin capuse

Prevenția se bazează pe controlul populației de căpușe și pe măsuri protective individuale. Astfel, se impune:

- **managementul arealelor favorabile dezvoltării căpușelor** – cu tăierea vegetației înalte (ierburi, tufișuri), tunderea gazonului, îndepărțarea/arderea frunzelor moarte, înlăturarea vegetației din vecinătatea sau de pe peretii caselor, astuparea crăpăturilor;
- **controlul animalelor gazdă** – cu distrugerea/îndepărțarea rozătoarelor (prin depozitarea corectă a gunoiului menajer, a proviziilor, deratizare preventivă/în focar), descurajarea prezenței unor animale silvaticе prin preajma casei, tratarea animalelor de companie (câini, pisici, etc.) și a celor domestice (oi, capre, vaci, cai și păsări de curte) cu acaricide adecvate, inclusiv dezinsecția adăposturilor lor;

- **controlul chimic (cu acaricide) al populațiilor de căpușe** - prin pulverizare pe zone restrânse (în curți, pe verande, terase, pereții caselor);
- **măsuri protective pentru om** – prin purtarea unor haine deschise la culoare, pantaloni lungi introduși în șosete de culoare deschisă, cu textură mai deasă, pantofi sport deschiși la culoare fără orificii sau decupaje (exclus sandale, papuci); utilizarea repelenților pe părțile descoperite (mâini, antebraț) sau prin pulverizare pe pantofi, șosete, pantaloni; inspectarea corpului cu atenție și înlăturarea căpușelor cu ajutorul unei pensete cu vârful bont, prin prinderea cât mai aproape de piele și tragerea în sus, astfel încât restul căpușei să nu rămână în piele. După înlăturare, pielea se va antiseptiza cu alcool (70%) și se va aplica un unguent cu antibiotic;
- **managementul expunerii profesionale** – prin purtarea echipamentului de protecție, instruire privind simptomatologia bolii și modalitățile de prevenire.

Cu consideratie,

Promovarea sanatatii,
As. pr. Igiena Veronica Nica

Sef Departament Supraveghere S.P.
Dr. Mihaela Dumitrescu
medic primar igiena

MMP

DIRECTOR EXECUTIV,
IORGĂ CRISTINA ELENA

