

INDICAȚII

Indicații în vederea următoarelor afecțiuni:

Hipersensibilitate la iodură de potasiu

Erupție herpetiformă

Deficiență cu valori mici ale complementului (afecțiuni autoimune foarte rare).

Contraindicații cu tiroidectomie au contraindicație la iodură de potasiu.

Există contraindicații pentru gravide și pentru femeile care alăptează.

EFFECTE ADVERSE

Există efecte hipersensibilitate, cum sunt erupții cutanate tranzitorii, glicandelor salivare, cefalee, bronhospasm, tulburări gastrointestinale; acestea pot fi ușoare sau severe ca intensitate și pot fi dependente de doză.

S-au raportat hipertiroidism, boli autoimune (Graves și Hashimoto), gușă nodulară toxică și hipotiroidism indus de iod.

Există cazuri în care, după administrarea, s-au raportat hiperactivitate tiroidiană, tiroidită, glicandei tiroide cu sau fără dezvoltarea mixedemului.

Administrarea continuă poate determina depresie, nervozitate, disfuncție sexuală și insomnie.

INFORMARE



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Iodură de potasiu 65mg

TERMENUL DE VALABILITATE: 3 ani

INFORMAȚII IMPORTANTE

Comprimatele de iodură de potasiu se administrează NUMAI în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a unui incident nuclear, în primele 6 ore după anunțul autorităților.

Păstrați pastilele de iodură de potasiu într-un loc sigur, uscat și răcoros, la întuneric.

Țineți minte unde depozitați pastilele de iodură de potasiu! Nu le lăsați la îndemâna copiilor!

CARE SUNT DOZELE RECOMANDATE?

Se administrează în doză unică după cum urmează:

